

◎ 4月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温：表層「平年並み」・底層「平年並み」、塩分：表層「やや高め」・底層「やや高め」、透明度：「かなり高め」

● 巾着網（中部標本船の月漁獲量（トン））

○カタクチイワシは平年を下回る漁獲量であった（図1）

● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
した類	少ない ↓	増加 ↑	同程度 ＝	2
マコガレイ	少ない ↓	減少 ↓	減少 ↓	3
オニオコゼ	同程度 ＝	減少 ↓	減少 ↓	4
シャコ	少ない ↓	増加 ↑	増加 ↑	5
こういか類	少ない ↓	減少 ↓	増加 ↑	6
アカガイ	多い ↑	減少 ↓	減少 ↓	7
トリガイ	多い ↑	増加 ↑	同程度 ＝	8

図1




図2




図3




図4




図5




図6




図7




図8




図1は漁獲量（トン）を示し、その他図は1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

 平年値     
  2025年     
  2024年     
  2023年  
 ※2015年から2024年の平均値

板びき網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
コノシロ	少ない ↓	増加 ↑	減少 ↓	9
あじ類	少ない ↓	同程度 ＝	減少 ↓	10
スズキ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	11
クロダイ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	12
じんどういか類	少ない ↓	同程度 ＝	同程度 ＝	13
こういか類	少ない ↓	同程度 ＝	増加 ↑	14

図9




図10




図11




図12




図13





図14



板びき網（南部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
あじ類	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	15
ヒラメ	多い ↑	増加 ↑	同程度 ＝	16
ハモ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	17
マダコ	同程度 ＝	同程度 ＝	同程度 ＝	18

図15




図16




図17





図18



図は1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

平年値
  2025年
  2024年
  2023年

※2015年から2024年の平均値