

◎ 5月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温：表層「平年並み」・底層「平年並み」、塩分：表層「平年並み」・底層「かなり高め」、透明度：「平年並み」

● 巾着網（中部標本船の月漁獲量（トン））

- カタクチイワシは平年並みの漁獲量であった（図1）
- イワシシラスは平年を下回る漁獲量であった（図2）

● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
した類	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	3
マコガレイ	少ない ↓	同程度 ＝	減少 ↓	4
がっちよ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	5
マゴチ	多い ↑	同程度 ＝	同程度 ＝	6
シャコ	同程度 ＝	増加 ↑	増加 ↑	7
小えび類	少ない ↓	増加 ↑	増加 ↑	8

図1




図2




図3




図4




図5




図6




図7




図8




図1、2は漁獲量（トン）を示し、その他図は1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値      ● 2025年      ◆ 2024年      ▲ 2023年

※2015年から2024年の平均値

板びき網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
コノシロ	同程度＝	増加↑	増加↑	9
いわし類	少ない↓	減少↓	同程度＝	10
スズキ	同程度＝	減少↓	減少↓	11
クロダイ	多い↑	減少↓	減少↓	12
ハモ	同程度＝	増加↑	増加↑	13
じんどういか類	同程度＝	増加↑	増加↑	14

図9




図10




図11




図12




図13





図14



板びき網（南部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
あじ類	少ない↓	減少↓	減少↓	15
マダイ	少ない↓	同程度＝	減少↓	16
ハモ	同程度＝	減少↓	同程度＝	17
マダコ	少ない↓	減少↓	同程度＝	18

図15




図16




図17





図18



図は1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

平年値
  2025年
  2024年
  2023年

※2015年から2024年の平均値