

配布先:

文部科学記者会、科学記者会、経済産業記者会、経済産業省ペンクラブ
 農林記者会、農政クラブ、水産庁記者クラブ、中小企業庁ペンクラブ
 資源記者クラブ、北海道教育記者クラブ、北海道経済記者クラブ
 府政記者会、兵庫県教育委員会記者クラブ、筑波研究学園都市記者会
 神戸市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、関西国際空港記者会
 報道各社 ご担当者様

2026 年 10 月 27 日

甲南大学

大阪府立環境農林水産総合研究所

水産研究・教育機構

北海道大学

産業技術総合研究所

理化学研究所

魚に DHA が多いのはなぜ？食物連鎖の未解明ルートを発見

研究成果のポイント

- 魚類は DHA を自身では生合成できず、謎であった供給源の解明に大きな前進
- 原生生物ラビリントウ類の環境 DNA 調査などから、生態系の上位捕食者への DHA 供給者として、この生物群が最大の影響力をもつことが判明
- 漁獲量の予測や保全、高効率な養殖への応用にも期待


概要

多価不飽和脂肪酸であるドコサヘキサエン酸(DHA)※¹は、我々ヒトに必要な不可欠な栄養素であり、脳や神経細胞の発達や機能維持に重要な役割を果たします。一方、ヒトは DHA を体内で十分に合成できないため、DHA を含む食物を摂取する必要があります。特に魚類は DHA を豊富に含んでおり、我々にとっての主要な DHA 供給源となっています。

甲南大学理工学部生物学科 本多大輔教授、甲南大学大学院自然科学研究科 森本冬海博士後期課程学生、大阪府立環境農林水産総合研究所、水産研究・教育機構、北海道大学、産業技術総合研究所、理化学研究所の研究グループは、三陸沖海域での年間を通じたモニタリングを行い、環境 DNA から推定された原生生物ラビリントウ綱※²のアプラノキトリウム類の現存量や、魚類の主要な餌である動物プランクトンのカイアシ類※³の食性などから、DHA の上位捕食者への供給において、アプラノキトリウム類の影響力が最も大きいことを明らかにしました(図 1)。

魚類や動物プランクトンなどの捕食者は DHA をほぼ生合成できないため、その供給源は一次生産者の植物プランクトンとされていましたが、捕食者と生産者の脂質組成が大きく異なる「DHA パラドックス」が知られていました。本研究はこの謎の解明に大きな前進をもたらすものとなります。

本研究の成果は、微生物生態学に関する国際科学誌 ISME Communications に掲載されました。



Press Release

1. 背景

海洋の消費者である魚類やその餌となる動物プランクトンは、DHA(炭素数 22)をほとんど生合成できず、一次生産者(植物プランクトン)が食物連鎖を介して供給していると考えられていました。しかしながら、全球の一次生産量の約半分を担う珪藻類は DHA を生合成するものの、組成は EPA(エイコサペンタエン酸:炭素数 20)^{※4}に大きく偏る組成となっており、一次生産者全体でも DHA:EPA $\approx$ 1:6 となることから、魚類がそれらをほぼ等量ずつ蓄積していることと矛盾する「DHA パラドックス」が知られていました。

単細胞従属栄養性の真核生物であるラビリントウ類は、DHA を生合成して高濃度に蓄積する能力をもち、褐藻類(コンブやヒジキなどを含む)や珪藻類と系統的に近縁であることから、DHA を工業的に生産する“藻類”としても着目されています。また、ラビリントウ類のうちアプラノキトリウム類が、珪藻類などの植物プランクトンを捕食する能力をもつことについて、本多教授と甲南大学大学院自然科学研究科 浜本洋子博士後期課程学生(研究当時)が培養実験によって発見し、2019 年に論文で報告していました(動画 1)。

論文 URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208941>



また、魚類は動物プランクトンのカイアシ類(動画 2)を主要な餌としていることが知られています。このカイアシ類の消化管内容物に含まれる DNA を 18S メタバーコーディング^{※5}によって網羅的に解読した結果、アプラノキトリウム類は生息する海水中よりも高い割合で検出されたことから、濃縮するようにカイアシ類に捕食されていることについて、東京大学大気海洋研究所 平井惇也講師、水産研究・教育機構、本多教授と浜本洋子さん(研究当時:博士後期課程学生)が、2018 年に論文で報告していました。

論文 URL: <https://doi.org/10.3800/pbr.13.75>



さらに、より多様な動物プランクトンを対象とした捕食-被食関係を調査した同様の結果が、鹿児島大学水産学部 小針統教授らによって 2021 年に報告されています。

論文 URL: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-02083-8>



2. 研究成果

本研究では、水産研究・教育機構が年に5回実施している、三陸沖から北海道南岸の親潮が流入する海域の調査(Aライン航海)において、沿岸から沖合約 600 km の6定点(A01~A21)で、表層から深層約 3000 m にかけての5層に観測点を設けて、1年を通してモニタリングを実施しました(図2、動画 3)。海水から採取した環境 DNA を対象として、定量 PCR^{※6}によってラビリントウ類、特にアプラノキトリウム類の細胞数とそこから炭素量に換算した現存量を推定しました。




図 2. Aライン航海において観測した6定点の位置

Press Release

その結果、以下のように、2021 年 7 月、2021 年 10 月、2022 年 5 月に栄養塩の豊富な親潮が流入した表層付近の観測点において、1リットルあたり数千から約5万細胞のアプラノキトリウム類が検出されました。アプラノキトリウム類が豊富に存在する観測点が、親潮によって植物プランクトン由来のクロロフィル濃度が大きい観測点と一致したことは、アプラノキトリウム類が環境中에서도植物プランクトンを捕食していることを示唆しています(図3)。しかしながら、現存量比では多い時でも主要生産者の2%程度であり、DHA 量比でも約 13%にとどまり、「DHA パラドックス」を解決するような数値ではありませんでした。




図3. 2021 年 7 月から 2022 年 5 月までの、Aライン航海において観測された、アプラノキトリウム類の細胞密度とクロロフィルa量、塩分の分布

そこで、Hirai et al. (2018) と Kobari et al. (2021) のデータを使用し、主要な DHA 生産者であるアプラノキトリウム類、珪藻類、渦鞭毛藻類がカイアシ類に捕食されている割合から、細胞数比、炭素量比を求めた上で、各生物群がもつ DHA 量比を計算したところ、56%、34%、10%となり、アプラノキトリウム類がカイアシ類に最も多くの DHA を供給していることが示唆されました(図4)。




図4. カイアシ類の消化管内容物から抽出された DNA に含まれる、アプラノキトリウム類、珪藻類、渦鞭毛藻類の 18S rRNA 遺伝子(18S rDNA)の相対的な量比から、細胞数比、炭素量比、そして DHA 量比を推定した計算過程

Press Release

そして、本研究で明らかにしたアプラノキトリウム類の 56%分の DHA が加わることで、カイアシ類の消化管内の組成が DHA:EPA=1:2.4 となり、DHA パラドックスの解消に大きく近づきました(図 5)。新しく認識された、EPA から DHA への変換と効率良い転送を行う、一次生産者(植物プランクトン)→アプラノキトリウム類→カイアシ類の流れを「アプラノキトリウム経路」と名付けました。



図 5. 本研究で明らかとなった、カイアシ類の消化管内容物に含まれる DHA と EPA の組成 (1:2.4)と、アプラノキトリウム類、珪藻類、渦鞭毛藻類における、それぞれの供給量比

アプラノキトリウム類の細胞密度(現存量)について、年間を通して比較的広い海域で調査した報告は、本研究が初めてですが、海水などから抽出された環境 DNA をメタバーコーディング解析して、含まれていた生物の多様性を明らかにしたデータは蓄積しつつあります。絶対量ではないので注意が必要ですが、下の表1のように、世界中の特に漁獲量の大きい海域で、アプラノキトリウム類を含むラビリinchュラ類の割合は高く、本研究で示唆された DHA 供給経路が親潮域だけの現象ではなく、より大きな影響力をもっている可能性があります(表 1)。

表 1. 各海域の海水から抽出された環境 DNA に対する 18S メタバーコーディング解析結果における、DHA を生産する藻類や原生生物のリード数の比較

		地中海*	紅海*	大西洋*	スペイン湧昇域	チリ湧昇域	親潮域
		De Vargas et al. (2017)			Castro et al. (2021)	Yarimizu et al. (2021)	本研究
	渦鞭毛藻類	16.0%	12.4%	16.5%	18%	22.1%	26.0%
	珪藻類	1.7%	0.8%	5.6%	16%	20.4%	14.0%
	クリプト藻類	0.4%	1.0%	1.6%	1%	0.2%	0.06%
	ハプト藻類	1.5%	0.7%	0.9%	1%	1.5%	0.5%
	ラビリinchュラ類	0.1%	0.1%	0.1%	4%	1.8%	0.6%

* 沿岸から50 km以内 * 0.8-20 μm 分画

3. 今後の期待

アプラノキトリウム類が魚類の必須脂肪酸である DHA の最大の供給者であり、認識されていなかった「アプラノキトリウム経路」が見出されたことから、海洋生態系の謎に対して、解明の糸口となるものと考えています。ラビリinchュラ類には、アプラノキトリウム類よりも現存量が大きい未分離で未同定の系統群が存在する可能性も知られており、また汽水域などにも豊富に存在するため、様々な生物との相互関係を含めて全体像を理解することが重要になると思われます。

また、DHA は孵化直後の仔魚の致死率や成長に大きな影響を及ぼすため、アプラノキトリウム類をモニタリングすることは、漁獲量の予測やそれによる保全のための基礎情報の提供につながる可能性もあります。

そして、ラビリinchュラ類を用いた DHA の工業的生産や、養殖魚類の餌料添加への応用は、すでに実用化されていますが、アプラノキトリウム類と珪藻類を混合培養することによって、EPA と DHA の割合を制御し、アプラノキトリウム類のもつ凝集塊を作る性質を合わせて、養殖対象の魚類に必要な大きさの餌粒子を作り出すことも可能であると考えています。

Press Release

4. 論文情報

[学術誌名] ISME Communications

DOI: 10.1093/ismeco/ycag178

掲載 URL: <https://doi.org/10.1093/ismeco/ycag178>



[論文タイトル] Ecological impact of algal-preying protists aplanochytrids (Labyrinthulea) as a source of docosahexaenoic acid for copepods in marine environments

[著者] Tomi Morimoto¹, Yoko Hamamoto¹, Takanori Shono², Mayumi Ueda³, Akira Kuwata⁴, Yukiko Taniuchi⁴, Hiroshi Kuroda⁵, Kazuaki Tadokoro⁴, Yuki Tsujimura³, Toshiki Miyaoka¹, Taichi Mogi², Hiroyuki Imai^{2,9}, Ryosuke Nakai⁶, Satoshi Nagai⁷, Tomoko Matsumoto⁸, Jun Kikuchi⁸, Daisuke Honda^{2,9*}

¹ 甲南大学大学院 自然科学研究科

² 甲南大学 理工学部 生物学科

³ 大阪府立環境農林水産総合研究所

⁴ 水産研究・教育機構 水産資源研究所

⁵ 北海道大学 低温科学研究所

⁶ 産業技術総合研究所 生命工学領域 バイオものづくり研究センター

⁷ 水産研究・教育機構 水産技術研究所

⁸ 理化学研究所 環境資源科学研究センター

⁹ 甲南大学 統合ニューロバイオロジー研究所

*責任著者

5. 用語説明

※1 ドコサヘキサエン酸(DHA): 炭素数 22、二重結合を 6 つもつ多価不飽和脂肪酸(22:6n-3)で、オメガ 3(n-3)系脂肪酸に分類されます。DHA は脳、神経組織、網膜の細胞膜に高濃度で存在し、細胞膜の流動性や神経機能の維持に重要な役割を果たしています。ヒトの体内でも少量は合成されますが、その効率は低いため、主に魚介類などの食品から摂取する必要があります。

※2 ラビリinchula綱: 水中に広く生息する単細胞の真核生物(原生生物)で、褐藻類や珪藻類などの黄色藻類や卵菌類などと一緒に、ストラメノパイル類(不等毛類)と呼ばれる系統群を形成します。DHA などの多価不飽和脂肪酸やアスタキサンチンなどのカロテノイド色素といった有用物質を生合成できることが知られており、それらの生態系における供給源としての役割や工業的な生産などでも着目されています。

※3 カイアシ類: 数 mm 程度の小型の甲殻類(節足動物)で、海洋では動物プランクトンの中で最も豊富な生物群の一つです。植物プランクトンや原生生物を摂食し、魚類などの高次捕食者の餌となることで、海洋の食物網をつなぐ重要な役割を果たしています。

※4 エイコサペンタエン酸(EPA): 炭素数 20、二重結合を 5 つもつ多価不飽和脂肪酸(20:5n-

Press Release

3)で、オメガ 3(n-3)系脂肪酸に分類されます。体内で炎症や血液凝固、血管の働きを調節する機能につながっており、心血管の健康維持や炎症の調節に重要な役割を果たしています。DHA と同様に、ヒトの体内でも少量は合成されますが、その効率は低いため、主に魚介類などの食品から摂取する必要があります。

※5 18S メタバーコーディング：水や土壌などから回収した環境 DNA を解析し、真核生物に共通する 18S rRNA 遺伝子の特定領域を PCR で増幅し、次世代シーケンサーで網羅的に塩基配列を読み取り、そのリード数から生物群集の組成や多様性を網羅的に明らかにする手法です。培養に依存せず、多数の真核生物を同時に検出して比較できるため、海洋や土壌などの生態系解析に広く利用されています。

※6 定量 PCR：PCR による DNA 増幅を蛍光シグナル量の変化としてリアルタイムに測定し、試料中に含まれる特定の DNA 配列や遺伝子を定量する手法です。微量の DNA でも高感度に検出できるため、微生物の存在量や遺伝子発現量の解析などに広く利用されています。なお、qPCR(quantitative PCR)として表記されることがあります。

6. 関連情報

動画 1 <https://youtu.be/6Ggo85d3BcE>



動画 2 <https://youtu.be/aC5QqDxWdFI>



動画 3 <https://youtu.be/m-89apwaL-Y>



7. 研究助成

本研究は JSPS 科研費 (JP21H02273、JP24K09042)の支援により実施されました。

《研究内容に関するお問い合わせ先》

甲南大学 理工学部生物学科 系統分類学研究室 教授 本多大輔

TEL：078-435-2515

E-mail：dhonda@konan-u.ac.jp

《取材に関するお問い合わせ先》

学校法人甲南学園 広報部

〒658-8501 神戸市東灘区岡本 8-9-1

TEL：078-435-2314

E-mail：kouhou@adm.konan-u.ac.jp

地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 企画部企画グループ 広報担当

TEL：072-979-7070

E-mail：kikaku@knsk-osaka.jp

Press Release

水産研究・教育機構 経営企画部広報課

E-mail : fra-pr@fra.go.jp

北海道大学社会共創部広報課

〒060-0808 札幌市北区北 8 条西 5 丁目

TEL : 011-706-2610 FAX : 011-706-2092

E-mail : jp-press@general.hokudai.ac.jp

国立研究開発法人産業技術総合研究所 ブランディング・広報部 報道室

〒305-8560 茨城県つくば市梅園 1-1-1

E-mail : hodo-ml@aist.go.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL : 050-3495-0247

E-mail : ex-press@ml.riken.jp

以上